


ငုံးမွေးမြူနည်း

[illegible]

နွေရာသီမတိုင်မီအနည်းဆုံး ၂-၆

ပတ်အလိုတွင်မွေးမြူထားသောလှောင်အိမ်ကိုသတ်မှတ်ပါ။ ၎င်းပုံမှန်အားဖြင့်နွေ ဦး

ရာသီကာလအတွင်းမွေးမြူရေးစတင်များနှင့်ဆောင်း ဦး

ရာသီမတဆင့်ကြက်ဥကိုဆက်ပြီးဆက်လက်။ ၄

င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်တွင်အဆင်ပြေစေရန်ဦးများကို ၂-၆

ပတ်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏မွေးမြူရေးစီမံကိန်းများမစတင်မှီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်နေရင်းဒေသကိုတည်ဆောက်ပါ။ [1]

- ဥပမာအားဖြင့်၊

ဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းကင်းကျက်စားရာနေရာများကိုသတ်မှတ်ပြီးငှက်များအတွင်း၌နေရာချထားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ နွေ ဦးပေါက်ရာသီရောက်သောအခါလျှော့အိမ်ထဲတွင်အဆင်ပြေသင့်သည်။



J

သင်၏ **လျှော့အိမ်** ကိုသားရဲတိရစ္ဆာန်များနှင့်ငြိမ်းချမ်းသောနေရာတွင် ထားပါ။ သင်၏ငှက်များသည်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားရပါကကြက်ဥများများများမဖြည့်တင်းနိုင်ပါ။ သူတို့ကိုလုံခြုံစိတ်ချရအောင်သင်ကသူတို့ကို coop

တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးနံရံနားမှာနေရာချမယ်။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များကိုလျှော့အိမ်ထဲမှဝေးအောင်ထားပါ။ [2]

- ငှက်တွေကမင်းရဲ့အိမ်မှာဆိုရင်၊ တီဗွီ၊

ရေဒီယိုလိုအသံကျယ်ကျယ်နဲ့မကပ်ပါနဲ့။ ထို့အပြင်မြင့်မားသောယာဉ်ကြောင့်ရိယာများမှသူတို့ကိုထားပါ။




၃

ငှက်တစ်ခုစီသည်အနည်းဆုံး ၁ စတုရန်းပေ (၀.၀၉၃ စတုရန်းမီတာ)

ရှိသည့်ငှက်တစ်ကောင်၏ကြမ်းပြင်spaceရိယာရှိကြောင်းသေချာစေပါ။ သင်၏ငှက်များသည်လှောင်အိမ်ထဲသို့လွတ်လပ်စွာနှင့်သက်သောင့်သက်သာရှိစွာလှုပ်ရှားနိုင်သင့်သည်။ သင်ဥများပေါက်ဖွားနေခြင်းကြောင့်ငှက်များကိုမွေးမြူရန်အကောင်းဆုံးသောလှောင်အိမ်သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ [3]

- ငှက်များသည်ကျဉ်းကျပ်နေပုံရပြီးတိုက်ခိုက်ရခက်ကြောင်းသင်သတိပြုမိပါက၎င်းတို့ကို ပို၍ကြီးသောလှောင်အိမ်ထဲသို့ရွှေ့ပါ။



၁

နေ့စဉ်မျိုးဆက်အစာရောနှောပါ။ အမြဲတမ်း မျိုးဆက်များအတွက်ရေးဆွဲထားသောရောနှောခြင်းအား ဖြင့် မျိုးပွားသူငှက် များကို အမြဲတမ်း အစာကျွေး ပါ။ ၎င်းသည်ကျန်းကျန်းမာမာကြက်ဥထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သောအာဟာရများနှင့်သူတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်အာဟာရချို့တဲ့မှုမရှိပါကငှက်ဥများများမထုတ်လုပ်နိုင်ပါ။

- အစားအစာကိုမြေပြင်ပေါ်တွင်သိုထားပါ။ သင်၏ငှက်များကိုလှောင်အိမ်ထဲတွင်သင်ထားရှိပါကငှက်တို့၏ကျောဘက်တွင်နို့တိုက်ကျွေးရန်ကျင်းကိုချိတ်ဆွဲထားပါ။ ငှက်မြေပေါ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုရင် ငှက်ရဲ့အောက်ခြေမှာသက်တောင့်သက်သာအနားယူနိုင်အောင်အနိမ့်အမြင့်အောက်မှာအိပ်ယာခင်းထားပါ။



J

ငှက်များသည်ငှက်များကိုမထုတ်လုပ်လျှင်ကယ်လစီယမ်ဖြည့်စွက်ထည့်ပါ။ ငှက်များအတွက်ကောင်းသောကယ်လစီယမ်ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်ကြိတ်ခွဲထားသောငှက်များ၊

ကြေမွထုံးကျောက်များနှင့်ကယ်လစီယမ်ရောမများပါဝင်သည်။ [4]သင်ရွေးချယ်သောဖြည့်စွက်ချက်ကိုသူတို့၏အစာထဲသို့ရောနှောပြီးသူတို့၏အစားအစာတွင်ကယ်လစီယမ်ပမာဏတိုးလာသည်။ အပိုကယ်လစီယမ်သည်ငှက်များကိုငှက်များပိုမိုထုတ်လုပ်ရန်အားပေးလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ကြက်ငှက်ပိုကောင်းအရည်အသွေးကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ [5]

- သင်တစ် ဦး
အစာကျွေးစတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းမှာကယ်လစီယမ်ဖြည့်စွက်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
- ဖြည့်စွက်ဆေးဖြင့်ကြက်ငှက်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းသည်ကယ်လစီယမ်၏ရောစပ်မှုဖြစ်သည်။



၃

လတ်ဆတ်သန့်ရှင်းသောရေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ နေ့စဉ်ရေကျင်းကိုနေ့စဉ်ထုတ်ပစ်ပါ။

ထို့နောက်သန့်ရှင်းသောရေဖြင့်မဖြည့်မီဆေးကြောပါ။ သင်၏ငှက်များသည်၎င်းတို့၏ရေကိုစောစောစီးစီး သင်သတိပြုမိပါကပိုမိုကြီးမားသောရေကျင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်နောက်ထပ်ရေအရင်းအမြစ်တစ်ခုပေးပါ။

- ရေပန်းကန်သည်ငှက်၏နောက်ကျောဘက်တွင်ချိတ်ဆွဲထားနိုင်ပြီးအချို့သောအိပ်ရာများ၏ရှေ့မှောက်၌မြေ၌ထိုင်နိုင်သည်။
- အနည်းဆုံးတစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်အရည်ပျော်နေသောအရည်ပျော်ပစ္စည်းကို သုံး၍ ရေကျင်းကိုပိုးမွှားသန့်စင်ပါ။



၁

မွေးမြူရေးကလောင်၌အထီးနှုန်းအမျိုးသမီးသုံး ဦး

အထိချထားပါ။ တောရိုင်းတွင်ငှက်များသည်တစ်မျိုးတည်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းတို့သည်တွဲစပ်ကြသည်။ သူတို့လယ်ယာမြေများတွင်သိုလှောင်ထားသည့်အခါငှက်များသည်အမျိုးသမီး ၃၊ ၄၊ ၅ နှင့်အမျိုးသမီး ၆ ဦး နှင့်မျိုးပွားနိုင်သည်! သင်၏မွေးမြူရေးငှက်များကို ၁: ၃၊ ၁: ၄၊ ၁ : ၅ တွင်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တွဲတွဲနိုင်သည်။ [6]

- တစ်ကြိမ်တွင်အထီး ၁
ယောက်ထက်ပိုမထည့်ပါနှင့်။ ယောက်ျားအထင်ကြီးခြင်းနှင့်မိန်းမတို့ကိုအထင်ကြီးရန်စစ်တိုက်မည်။
- တွဲဖက်ငှက်များသည်များသောအားဖြင့်ဥများပိုမိုထုတ်လွှတ်ပြီးသူတို့၏ကြက်များကို ပို၍ဂရုပြုလိမ့်မည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်အမျိုးသမီး ၂-၃ ယောက်နှင့်အတူယောက်ျားလေးပေါက်ပါကရှင်သန်နေသောကြက်များပိုများလိမ့်မည်။
- သင်ဥများကိုစားလိုလျှင်အထီးကိုလှောင်အိမ်ထဲသို့မထည့်ပါနှင့်။ ဥငှက်သည်အထီးရှိမရှိဖြစ်စေဥများကိုဥလိမ့်မည်။ သို့သော်သူတို့သည်ကြက်များရှိနိုင်သောမြေဩဇာကောင်းသောဥများကိုထုတ်လုပ်ရန်အထီးနှင့်မိတ်ဖွဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်အမျိုးသမီး ၅ ယောက်လောက်အတူတကွသင်ထားနိုင်သည်။ [7]




J

သင်၏ငှက်များကိုနေ့စဉ် ၁၄ နာရီမှ ၁၆

နာရီအလင်းဖြင့်ပေးပါ။ နေရောင်ခြည်သည်သင်၏ငှက်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သို့သော်သင်သည်လည်း UV lamp

အတုကိုသုံးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်နွေရာသီနှင့်နွေရာသီတို့တွင်နေ့တာရှည်သည့်အခါမိတ်လိုက်သောကြောင့်
ငှက်ငှက်များကိုမွေးမြူရန်အားပေးသည်။ [8]

- သူတို့ကို ၁၆ နာရီထက်ပိုတဲ့အလင်းရောင်နေ့စဉ်မပေးရနဲ့၊ သူတို့ကညာမှာအနည်းဆုံး ၈ နာရီအိပ်ဖို့လိုတယ်။




၃

မွေးမြူရေးကိုအားပေးဖို့သင့်ရဲ့ဘောပင်ကို ၇၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၂၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)

မှာထားပါ။ မွေးမြူရေးကလောင်၏အပူချိန်ကိုထိန်းညှိရန်အပူပေးစက်သို့မဟုတ်ပန်ကာကိုသုံးပါ။ အေးသို့မဟုတ်ပူနွေးသောအပူချိန်များသည်ငှက်များကိုမိတ်လိုက်ခြင်းကိုတားဆီးလိမ့်မည်။ [\[၉\]](#)

- သာမိုမီတာကိုဘောပင်ထဲထည့်ပြီးအပူချိန်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးလိုအပ်လျှင်ချိန်ညှိနိုင်သည်။



၄

သင်၏ငှက်များကိုအသိုက်လုပ်နိုင်ရန်ကောက်ရိုးများနှင့်မြက်ပင်များဖြင့်ပေးပါ။ သဘာဝတွင်အသိုက်တည်ဆောက်ခြင်းသည်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ တွဲဖက်ငှက်များကိုသူတို့မမိတ်ခင်အတူတကွအသိုက်တည်ဆောက်မည်။ သင်၏ငှက်များကိုလတ်ဆတ်သောမြက်ပင်များနှင့်မြက်ပင်များပေးခြင်းကငှက်တို့ကိုအသိုက်တည်ဆောက်ရန်နှင့်ငှက်များကိုတည်ဆောက်ရန်အားပေးလိမ့်မည်။ ကတ်ထူပြားသို့မဟုတ်သစ်သားအပိုင်းအစတစ်ခု ထပ်၍ ထည့်ပါ။

သို့မှသာပတ်ဝန်းကျင်အသစ်ရှိနိုင်သည်။ [\[10\]](#)

- အသိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက်အသုံးမပြုသောကောက်ရိုးများနှင့်မြက်ပင်များကိုဖယ်ရှားပါ။ ငှက်များသည်သန့်ရှင်း။
သက်သောင့်သက်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိစေရန်လတ်ဆတ်သောမြက်ပင်နှင့်မြက်ပင်ဖြင့်အစားထိုးပါ။




၁

သင်၏ငှက်အများစုသည်သဘာဝပေါက်ဖွားမှုမှရှင်သန်ရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ငှက်များသည်သူတို့စနစ်တကျဖွံ့ဖြိုးလာပါကအထူးဂရုပြုရန်လိုသည်။ မိဘများသည်ငှက်များကိုအမြဲတမ်းနွေးထွေးစွာထားရန်လိုအပ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ငှက်များသည်မျိုးရိုးဗီဇဖြစ်လာခြင်း (သို့)

အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၎င်းတို့၏အသိုက်ကိုစွန့်ခွာခြင်းတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့၏ဥများရှင်သန်ခြင်းမရှိခြင်း (သို့) တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်ပေါက်ဖွားခြင်းမရှိခြင်းသည်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ [\[11\]](#)

- သင်၏ကြက်ဥများကိုပိုမိုပေါက်ဖွားစေနိုင်သောကြောင့်သင်၏ဥများကိုပေါက်ရန်အတွက်အင်ကူတာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။



J

သိသိသာသာပျက်စီးသောဥများကိုဖယ်ရှားရန်လက်အိတ်များကိုဝတ်ဆင်ပါ။ ကြက်ဥများအက်ခြင်းနှင့်ပျက်ခြင်းဖြစ်ခြင်းသည်ဥများကိုတစ်ခုလုံးပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ဒီဥတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာအကောင်းဆုံး။ သို့သော်သင်ပေါက်ဖို့မျှော်လင့်သောကြက်ဥကိုအနှောင့်အယှက်မပေးလိုပါ။ အသိုက်သို့မဟုတ်ပေါက်ဖွားရာမှပျက်စီးနေသောကြက်ဥကိုဂရုတစိုက်ဆွတ်။ [\[12\]](#)


- ကျန်းမာသောဥများကိုပျက်စီးစေနိုင်သည့်အလွန်ပျက်စီးသောကြက်ဥများကိုသာဖယ်ရှားပါ။ အကယ်၍
သင်သည်ဦးများကိုသူတို့ကိုပေါက်ဖွားစေရန်ကြိုးစားနေပါကဦးသည်သူတို့၏ဥများကိုစွန့်ခွာရန်မလိုပါ။



၃

မိဘများကငြင်းပယ်နိုင်သောကြောင့်သင်သိမ်းချင်သောကြက်ဥကိုမထိပါနှင့်။ သဌသညသုတို့ကိုကိုင်တွယ်လျှင်ဦးဥများစွန့်ပစ်လိမ့်မည်၊ ဆိုလိုတာကကြက်ဥစနစ်တကျပေါက်ဖွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြက်ဥတွေကိုလေ့လာပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုမကောက်ပါ။ [13]

- ထိုပေါက်ဖွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပြတ်တောက်ခြင်းဥဥမှပေါက်ဖွားလာခြင်းနှင့်ဥမပေါက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သူတို့ကပေါက်လျှင်ထိုကြက်သည်ကြီးထွားမည်မဟုတ်ပါ။ ယင်းသည်သင့်လျော်စွာဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။



၄

မိဘများသည်ကြက်ဥများပေါ်တွင် ၁၇-၂၄

ရက်ကြာထိုင်ပါစေ။ မိခင်ကြက်မနှင့်ဖခင်သည်ဥများကိုစနစ်တကျပေါက်နိုင်စေရန်အတွက်ပေါက်ဖွားသည့်ကာလတစ်ခုလုံးအတွက်ဥများကိုနွေးစွာထားရမည်။ သူတို့သည်ဥများပေါ်တွင်အလှည့်ကျလာပြီးတစ်ခါတစ်ရံသူတို့နှင့်အတူထိုင်ကြပေမည်။ အနည်းဆုံးမိဘတစ်ဦးသည်ဥများ၌ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့ဆက်နွယ်သင့်သည်။ [\[14\]](#)

- တွဲစုံတွဲများအတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ပိုများပါတယ်။
- ၂၃ ရက်မှ ၂၄ ရက်အတွင်းများသောအားဖြင့်ငုံးများပေါက်သော်လည်းများသောအားဖြင့်ဂျပန်ငုံးများသည် ၁၇-၁၈ ရက်အတွင်းပေါက်တတ်သည်။



၁

သင်၏ကြက်ဥမညစ်ညမ်းစေရန်ရှောင်ရှားရန် သင်၏လက်များကို မကြာခဏ ဆေးကြောပါ။ ။ သဂျသ
ညျဉကိုစုဆောင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်သွားလျှင်၊
သင်သန့်ရှင်းသောလက်ရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သင်၏လက်များကိုနူးညံ့သောဆပ်ပြာဖြင့်နူးညံ့သော
ရေတွင်အနည်းဆုံးစက္ကန့်၂၀
လောက်ဆေးကြောပါ။ ထို့နောက်လက်များကိုစင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ။ သန့်ရှင်းသောသုတ်ပဝါနှင့်သူတို့
ကိုသွေ့ခြောက်ပါ။ [15]



J

ကြက်မသည်တစ်နေ့ ၁

လုံးခန့်ကျမည်ဖြစ်သောကြောင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဥများကိုစုဆောင်းပါ။ ကြက်မတစ်ကောင်သည်ဥတစ်လုံးတည်းဖြစ်သောကြက်ဥတစ်လုံးလုံးကိုသူမကြက်မပြီးသည်အထိကြက်မတစ်ကောင်သည်တစ်နေ့ ၁ ဥကိုဥရမည်။ အသိုက်ထဲတွင်နေ့တိုင်းအသိုက်ကိုစစ်ဆေးပြီးဥများကိုဖယ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်ကအင်ဗူတာတာကိုအသုံးပြုနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာသင့်အချိန်ဇယားမှာဥများကိုထည့်သွင်းချင်တယ်။ [\[16\]](#)

- ကြက်ဥများသည်အတက်မကျက်ဘဲရပ်တန့်သွားပါကကြက်သည်ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြက်ဥပေါက်လျှင်ဥသည်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်ပေ။



၃


အက်ကွနေသောကြက်ဥများကိုစွန့်ပစ်ပါ။ ဤဥများသည်လုံးလုံးဥပေါက်ပါကကျန်းမာသောကြက်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ကြက်ဥကြီးများသည်များသောအားဖြင့်ကျန်းမာရေးနှင့်မညီညွတ်သောကြက်များကိုပေါက်လေ့ရှိသော်လည်းကြက်ဥသေးသေးလေးများကပုံမှန်အားဖြင့်ရှင်သန်ကြီးထွားနိုင်ခြင်းမရှိသည့်သေးငယ်သောကြက်များကိုထုတ်လုပ်လေ့ရှိသည်။ ကြက်ဥတွေကိုဖယ်ရှားပြီးသင့်အမှိုက်သရိုက်ထဲမှာအကောင်းဆုံး။ [\[17\]](#)

- ကြက်ဥတစ်လုံးသည်သင်၏ကျန်းမာသောဥများကိုညစ်ညမ်းစေနိုင်သည်။
 ထို့ကြောင့်သင်သံသယဝင်လျှင်ကြက်ဥကိုထုတ်ပစ်ပါ။ သို့သော်၊ သင် ၁၀၀%
 သေချာသည်ကင်းသည်ကြက်ဥမကောင်းကြောင်းသေချာစေပါ။ ကြက်ဥကောင်းတစ်လုံးကိုမင်း
 မပစ်ချင်ဘူး!



၄


ဥ၏အပြင်ဘက်ကိုမသုတ်ပါနှင့်။ ကြက်ဥများသည်သူတို့၏အခွံပေါ်တွင်သဘာဝအကာအကွယ်အတားအဆီးတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ ငုံးငှက်သည်ဗက်တီးရီးယားများနှင့်ရောဂါပိုးများမှကာကွယ်ပေးသည်။ ကြက်ဥများကိုမပေါက်ခင်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ [\[18\]](#)



၅

ကြက်ဥသည်၎င်းတို့ကိုစုဆောင်းပြီးနောက် ၃-၇ ရက်အတွင်းအနားယူပါစေ။ ဥများကိုသင်စုဆောင်းပြီး ၃ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်းအပူချိန် ၅၅ မှ ၆၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၁၃ မှ ၁၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ရှိသောနေရာတွင်သူတို့အနားယူပါစေ။ သူတို့ကိုရက်အနည်းငယ်အနားယူထားခြင်းက၎င်းတို့အားပေါက်ဖွားရန်ပြင်ဆင်ပေးသည်။ [19]

- လတ်ဆတ်ပြီးသိုလှောင်ထားသည့်ဥများကိုအတူတကွမထားပါနှင့်။
- ကြက်ဥကိုအနားယူရန်အရှည်ကြာစွာသင်အနားယူနိုင်သည်မှာ ၁၀ ရက်ဖြစ်သည်။ သို့သော်တစ်ပတ်မကုန်မှီသူတို့ကိုသူတို့ကို incubator တွင်ထားသင့်သည်။




၆

တစ်ဦးအတွက်ကြက်ဥထားပါ တင်နေတာ 24 ရက်အတွင်းမှတက်သည်။ အပူချိန်အား ၉၉.၅ မှ ၁၀၂ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၃၇.၅ မှ ၃၈.၉ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ကြားတွင်ထားရှိပါ။ ၅၈ ရာနှုန်းသောစိုထိုင်းဆကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည့်ဥများကိုဥများမြှုပ်ထားပါ။ ကြက်ဥများကိုဥမင်ထဲ၌ ထည့်ထားသည့် ၂၄ ရက်သို့မဟုတ်သူတို့ပေါက်သည်အထိချန်ထားပါ။ [20]

- စိုထိုင်းဆကိုတိုင်းတာသည့်အရာအားခွဲစိတ်ရန် hygrometer ကိုပူးတွဲပါ။

- သင့်အတွက်ဥများကိုပက်ဖြန်းပေးသည့်နွေးထွေးသောအင်ဂျင်စက်များကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ရေပွက်ပွက်ဆူနေသောရေတွင်ပန်းကန်တစ်ခုထားခြင်းဖြင့်စိုထိုင်းဆကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။



၇

ကြက်ဥအဆုံးကိုအဆုံးကြီးအောက်တွင်ထားပါ။ လေအိတ်ကပ်သည်ဥ၏ကြီးမားသောအဆုံးတွင်ရှိလိမ့်မည်။ ကြက်ကြီးသည်အဆုံးသို့ဦးတည်။ ကြီးထွားရန်အရေးကြီးသည်။ အကယ်၍ အဆုံးကြီးသည်အောက်ခြေတွင်ရှိပါကကြက်သည်ခေါင်းကိုမှားယွင်းသောအရာဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသင့်သည်ကြက်မကြီးရှင်သန်ရန်ခက်ခဲစေသည်။ [\[21\]](#)



၈

သူတို့ပေါက်နေတဲ့ဥတွေကိုတစ်နေ့ ၃-၅ ကြိမ်မှာ ၉၀ ဒီဂရီလှည့်ပါ။ ၄-၅

နာရီတိုင်းကြက်ဥကိုစစ်ဆေးပါ။ ကြက်များကြီးထွားလာအောင်သေချာစေရန်ကြက်ဥကိုမကြာခဏလှည့်ပါ။ [\[22\]](#)


- သင်ကြိုက်လျှင်ကြက်ဥလှည့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ အချို့သောနွေးထွေးသောဓာတ်ငွေ့များအနေဖြင့်၎င်းကိုအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သောဥမှန်များပါ ၀ န်သည်။



၁

အပြည့်အဝပေါက်နိုင်ရန်အတွက် ၁၀ နာရီမှ ၂၀ နာရီခန့်ကြာအောင် **ကြက်များသည်** မျှော်လင့်ပါ။ ၂၄ ရက်ခန့်ပေါက်ဖွားပြီးနောက်၊ ကြက်များသည်ပေါက်လာလိမ့်မည်။ သူတို့ကိုမကူညီပါနှင့်၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်မပေါက်နိုင်သည့်ကြက်များသည်ကြီးပွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သားပေါက်များသည်မကြာခဏအနားယူမည်ဖြစ်ရာ၎င်းတို့အားအပြည့်အဝပေါက်ရန် ၁၀ နာရီမှ ၂၀ နာရီခန့်ကြာမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ [23]


- သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်ဥပေါက်နေပြီးနောက် ၁ ရက်အထိမပေါက်နိုင်သည့်ဥများကိုပေးပါ။ ဤအချက်မှာသင်ဥမပေါက်နိုင်သကဲ့သို့သင်ဥများကိုထုတ်ပစ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သူတို့ပေါက်လာလျှင်ကြက်များသည်မကျန်းမာပါ။
- ငုံးမျိုးပွားများမှာ ၂၃ မှ ၂၄ ရက်အတွင်းတွင်ပေါက်ဖွားနိုင်သော်လည်းဂျပန်ငုံးများသည်ပေါက်ရန် ၁၇ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိကြာသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဂျပန်ငုံးများကိုပြုစုပျိုးထောင်လျှင်၊



J

အကောင်ပေါက်ဟုခေါ်သောမြက်ပေါက်ငယ်များကိုသေတ္တာငယ်လေးထဲထည့်ပါ။ ကြက်များသည်ပထမပတ်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဘေးကင်းစွာနေမည်။ သေတ္တာကိုသစ်သားပြားများဖြင့်ဖြည့်၍ အဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်။ [\[24\]](#)

- သင်၏အရွယ်ရောက်ပြီးသောငှက်များကိုသူတို့၏ဥများပေါက်ဖွားရန်သင်ခွင့်ပြုပါကကြက်များကိုသူတို့နှင့်အတူထားခဲ့ပါ။ သို့သော်သူတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းချုပ်ရန်ခက်ခဲသောကြောင့်သူတို့သည်ပွဲစားများကဲ့သို့အသက်ရှင်နိုင်သကဲ့သို့မရှင်သန်နိုင်ပါ။



၃

ပထမ ၂ ပတ်အတွင်း brooder ကို ၉၅ မှ ၉၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၃၅ မှ ၃၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)


အထိအပူပေးပါ။ ကြက်များသည်နွေးထွေးရန်လိုအပ်သည်။

သို့မှသာဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်။ သူတို့ကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှသင်သည်အပူချိန်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ သီတင်းပတ် ၃ ရက်မှ စ၍ ၇၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၂၄ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) အထိအပူချိန် ၅

ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)

ကိုအပတ်တိုင်းလျှော့ချပါ။ ယင်းကကြက်များကိုကျန်းမာစွာကြီးထွားစေနိုင်သည်။ [\[25\]](#)

- brooder ကိုနွေးရန်အပူမီးခွက်ကိုသုံးပါ။



၄

ပထမ ၃ ရက်အတွက် brooder တွင် ၁၀၀

ဝပ်အလင်းထားပါ။ ညအချိန်တွင်ပင်ယင်းကိုလုံးဝမပိတ်ပါနှင့်။ သူတို့မျက်လုံးများသည်မဖွံ့ဖြိုးသေးသောကြောင့်သူတို့အစာနှင့်ရေကိုရှာဖွေရန်အလင်းရောင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့အားတစ် ဦးနှင့်တစ် ဦး မထိမခိုက်စေရန်ကူညီလိမ့်မည်။ [\[26\]](#)

- ပထမသုံးရက်အကြာတွင်သင် dimmer light သို့ပြောင်းနိုင်သည်။ သို့သော်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မထိတွေ့မိစေရန်ကြက်များကိုတားဆီးရန်အတတ်နိုင်ဆုံးအလင်းကိုထားပါ။



၅

ထိုကြက်များကိုစတင်အစာနှင့်ရေပေးပါ။ starter

အစာနှင့်ရေချိုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကြက်များသည်တစ်နေ့လုံးစားကျက်သွားလိမ့်မည်။ ညစ်ညမ်းသောအစားအစာများကိုဖယ်ရှားပြီးလမ်းကျဉ်းကိုဖြည့်ရန်တစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်အစာကျွေးပါ။ တစ်နေ့လျှင်နှစ်ကြိမ်ရေကိုစွန့်ပစ်ပါ။ [\[၂၃\]](#)

- ကြက်မများမရေစေရန်ရေနည်းသောပန်းကန်ကိုရွေးချယ်ပါ။